










ABECEDAIRE DE LA PREVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES

PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS D'UN PATIENT ATTEINT DE	VOIE DE TRANSMISSION EN MILIEU DE SOINS	PERIODE D'INCUBATION DE LA MALADIE	DUREE DE CONTAGIOSITE	TYPE DE PRECAUTION COMPLEMENTAIRE	COMMENTAIRES, MESURES SPECIALES, LEVEE D'ISOLEMENT
Bactéries multi-résistantes (BMR) TOUTE infection à BMR	Manuportée (voire digestive)	Variable	Variable		Importance de l'hygiène des mains Une BMR dans les voies respiratoires n'est plus en précautions Gouttelettes
<i>Clostridioides difficile</i>	Digestive (orofécale) et Manuportée	non précisée	Non précisée	 manches longues (KIT CLOSTRIDIUM)	Isolement jusqu'à résolution des diarrhées Pas de prélèvement de contrôle (risque de portage chronique de toxines qui ferait maintenir une antibiothérapie prolongée) INEFFICACITE des SHA : lavage des mains uniquement (contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Coqueluche	Aéroportée	7 à 15 jours	- maximale pendant la phase catarrhale - 7 jours après exposition à 5 semaines après le début des quintes de toux	 Chambre individuelle	Isolement 7 jours après le début du traitement Masque FFP2 pour les soignants lors de geste à risque d'aérosolisation (exemples) : - kiné respiratoire - intubation, extubation, VNI - fibroscopie, aspiration - prélèvement nasal et naso-pharyngé
Erysipèle	Contact cutané	long si non traité (plusieurs semaines)	10 à 21 jours si non traité		Levée d'isolement 24h après début du traitement antibiotique Port de masque parfois recommandé dans des situations d'épidémie Port de masque lors des pansements des lésions cutanées suintantes Transmission possible par l'environnement
Infection invasive à Streptocoque A	Contact cutané ± Aéroportée selon site infecté	non précisée	non précisée		Levée d'isolement 24h après début du traitement antibiotique Port de masque en cas d'atteinte pulmonaire Port de masque lors des pansements en cas de plaies Transmission possible par l'environnement

(Streptococcus pyogenes)				avec matériel dédié Chambre individuelle	Identification des cas contacts et des personnes avec facteur risque de développer une forme grave. (Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement ou le point focal de l'ARS BFC).
Gale	Contact Cutané prolongé	jusqu'à 3 semaines	48h après le traitement	 Manches longues [KIT GALE]	Levée d'isolement 48h après le traitement Changer et traiter le linge et la literie après chaque traitement Cas particulier : gale hyperkératosique ou gale norvégienne, très contagieuse (contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations) (Si plusieurs cas : voir le [KIT GALE] - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Gastro entérite (diarrhée présumée infectieuse)	Digestive, Orofécale et Manuportée	variable	tant que dure la diarrhée	 Chambre individuelle ou cohoting	Isolement jusqu'à résolution des diarrhées (si plusieurs cas : voir le [KIT GEA] - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Grippe	Aéroportée et Manuportée	1 à 3 jours	1 jour avant et 7 jours après le début des signes cliniques	 Chambre individuelle ou cohoting	Isolement 7 jours après le début des signes, même si traitement Vaccination préventive du personnel. Masque FFP2 pour les soignants lors de geste à risque d'aérosolisation : - kiné respiratoire - intubation, extubation, VNI - fibroscopie, aspiration - prélèvement nasal et naso-pharyngé (Si plusieurs cas : voir le [KIT IRA] - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)

Hépatites A, E	Digestive, Orofécale et Manuportée	10 à 60 jours	15 jours avant et 8 jours après le début de l'ictère	 (diarrhée) Chambre individuelle	Isolement 8 jours après le début de l'ictère Hépatite A : Vaccination professionnels de petite enfance / handicapés, et restauration Hépatite E : Eloigner les femmes enceintes
Herpès cutanéomuqueux récurrent (oral, génital, cutané)	Contact Cutanéomuqueux	2 à 15 jours	durée des lésions	Précautions standard uniquement	Eviter le contact direct de soignants présentant une récurrence herpétique avec les patients de néonatalogie ou de pédiatrie
Herpès généralisé	Contact Cutanéomuqueux	2 à 15 jours	durée des lésions	 Chambre individuelle ou cohoring	Isolement jusqu'à formation des croûtes Eviter le contact avec les immunodéprimés
Norovirus	Digestive, Orofécale et Manuportée			 (diarrhée) et  (si vomissements +++) Chambre individuelle ou cohoring	Responsable d'épidémie de Gastro-Entérites Aigues (GEA). (Si plusieurs cas : voir le KIT IRA - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Rotavirus	Digestive, Orofécale et Manuportée	1 à 2 jours	4 à 7 jours		Isolement 7 jours Affection très épidémique (Si plusieurs cas : voir le KIT GEA - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)

Rougeole	Aéroportée	10 à 14 jours	5 jours avant et jusqu'à 5 jours après l'éruption	 Chambre individuelle	Isolement jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption Vaccination préventive recommandée Maladie à DECLARATION OBLIGATOIRE Eviter tout contact avec sujet à haut risque : immunodéprimé, femme enceinte, enfant < 1 an
SARS-CoV2 (Covid-19)	Aéroportée et Manuportée	En fonction des variants 2 à 7 jours	1 jour avant début des signes cliniques et jusqu'à 7 jours	 Chambre individuelle	Isolement jusqu'à 7 jours après le début des signes cliniques (10 j si immunodépression) ET 48h sans fièvre/dyspnée. Eviter les contacts avec sujets à risque 7 jours supplémentaires (14j si immunodépression). Port du masque chirurgical pour le patient lorsqu'il sort de sa chambre et lors des soins s'il tousse Masque FFP2 pour les soignants lors de geste à risque d'aérosolisation : - kiné respiratoire - intubation, extubation, VNI - fibroscopie, aspiration - prélèvement nasal et naso-pharyngé (Si plusieurs cas : voir le KIT IRA - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Tuberculose pulmonaire	Aéroportée	minimum 6 semaines, et jusqu'à plusieurs mois ou années	du début des signes cliniques à au moins 15 jours après la mise en œuvre du traitement	 Chambre individuelle	Maladie à déclaration obligatoire Port du masque chirurgical pour le résident/patient lorsqu'il sort de sa chambre.
Varicelle	Aéroportée et Manuportée	14 jours environ	2 jours avant les signes cliniques et jusqu'à la phase de décrustation (chute des croûtes)	 Chambre individuelle	Isolement jusqu'à chute des croûtes Eviter le contact avec les patients immunodéprimés ou les femmes enceintes non immunisées Vaccination préventive recommandée pour le personnel • <i>Définition d'un sujet exposé</i> : 1. Avoir séjourné plus d'1 heure dans la même pièce qu'un cas de varicelle contagieux dans les 2 jours précédant l'éruption et pendant l'éruption. Si la durée de contact a été inférieure à

					1 heure mais que le contact a été très étroit (= intubation, examen clinique, proximité à moins d'1 mètre), le risque de transmission existe. 2. Plus rarement, après contact cutané direct avec des vésicules non desséchées (varicelle ou zona).
Virus respiratoire syncytial (VRS)	Aéroportée	2 à 8 jours	7 jours		Isolement jusqu'à guérison clinique (Si plusieurs cas : voir le KIT IRA - Contacter l'équipe d'hygiène qui intervient dans votre établissement pour adapter les recommandations)
Zona de l'immunocompétent (forme localisée)	Manuportée	réactivation	jusqu'à la phase de décrustation (chute des croûtes)		Isolement jusqu'à chute des croûtes Eviter le contact avec les patients immunodéprimés ou les femmes enceintes non immunisées <i>Définition d'un sujet exposé</i> : rarement, après contact cutané direct avec des vésicules non desséchées (varicelle ou zona)
Zona de l'immunodéprimé (forme généralisée)	Aéroportée et Manuportée	réactivation	jusqu'à la phase de décrustation (chute des croûtes)		Isolement jusqu'à chute des croûtes Eviter le contact avec les patients immunodéprimés ou les femmes enceintes non immunisées



: Précautions **CONTACT**



: Précautions **GOUTELLETES**



: Précautions **AIR**